

Durchschnittliche N_{min} -Richtwerte - 5-jähriges Mittel für die Vorplanung 2024

Stand: August 2023

| Bodenklimaraum | Schicht cm | Winterungen | | | | Sommerungen Aussaat/Pflanzung März | | Sommerungen Aussaat/Pflanzung April | |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | Raps kg N_{min} /ha | Stoppelweizen kg N_{min} /ha | Winterweizen mit Blattvorfrucht* kg N_{min} /ha | Wintergerste, -Roggen, -Triticale kg N_{min} /ha | VF Blattfrucht* kg N_{min} /ha | VF Getreide kg N_{min} /ha | VF Blattfrucht* kg N_{min} /ha | VF Getreide kg N_{min} /ha |
| 9; 46; 51 sandige Böden (Ost) | 0-30 cm | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 |
| | 30-60 cm | 7 | 8 | 13 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| | 60-90 cm | 9 | 16 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| | Gesamt | 27 | 35 | 42 | 27 | 31 | 31 | 28 | 31 |
| 48; 50 sandige Böden (West) | 0-30 cm | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 |
| | 30-60 cm | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 |
| | 60-90 cm | 13 | 14 | 18 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| | Gesamt | 33 | 37 | 38 | 33 | 30 | 33 | 27 | 34 |
| 45, 47 Lehmböden, leichte Lehmböden | 0-30 cm | 12 | 12 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 16 |
| | 30-60 cm | 10 | 17 | 21 | 10 | 12 | 17 | 15 | 15 |
| | 60-90 cm | 10 | 22 | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| | Gesamt | 32 | 51 | 60 | 35 | 36 | 49 | 43 | 45 |
| 11, 34 schwere Lehmböden, Hügelland (>200m) | 0-30 cm | 11 | 11 | 13 | 9 | - | 16 | 14 | 14 |
| | 30-60 cm | 9 | 11 | 14 | 9 | - | 16 | 12 | 14 |
| | 60-90 cm | 10 | 15 | 19 | 11 | - | 16 | 11 | 15 |
| | Gesamt | 30 | 37 | 46 | 29 | - | 48 | 37 | 43 |
| 52 Marschen, Tonböden | 0-30 cm | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 |
| | 30-60 cm | 12 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| | 60-90 cm | 12 | 22 | 23 | 19 | 18 | 12 | 14 | 12 |
| | Gesamt | 36 | 54 | 56 | 50 | 50 | 41 | 46 | 41 |

Bitte beachten: die N_{min} -Richtwerte für Sommerungen können aufgrund der aktualisierten Darstellungsweise nicht im 5-jährigen Mittel ausgewiesen werden. Der Durchschnittswert berechnet sich aus den Richtwerten der Jahre 2020 bis 2023.

*Blattvorfrucht: i.d.R. Ackergras, Winterraps, Mais, Zuckerrübe, Kartoffel, Leguminosen und Gemüse