

Durchschnittliche N_{min}-Richtwerte für die Düngebedarfsermittlung 2026

Stand: Juni 2025

Bodenklimaraum	Schicht cm	Winterungen		
		Raps kg N _{min} /ha	Winterweizen kg N _{min} /ha	Anderes Wintergetreide kg N _{min} /ha
9; 46 sandige Böden (Ost)	0-30	10	10	9
	30-60	9	8	6
	60-90	8	11	8
	Gesamt	27	29	23
51 sandige Böden Elbe-Weser- Dreieck	0-30	11	11	10
	30-60	6	8	6
	60-90	6	9	7
	Gesamt	23	28	23
48; 50 sandige Böden (West)	0-30	10	11	10
	30-60	8	10	8
	60-90	9	14	11
	Gesamt	27	35	29
45 Lehmböden	0-30	13	13	10
	30-60	9	15	8
	60-90	8	18	10
	Gesamt	30	46	28
47 leichte Lehmböden	0-30	11	13	11
	30-60	9	12	9
	60-90	6	13	9
	Gesamt	26	38	29
11, 34 schwere Lehmböden, Hügelland (>200m)	0-30	12	12	9
	30-60	9	13	9
	60-90	8	16	8
	Gesamt	29	41	26
52 Marschen, Tonböden	0-30	12	13	12
	30-60	12	16	14
	60-90	12	16	15
	Gesamt	36	45	41

Durchschnittliche N_{min}-Richtwerte für die Düngbedarfsermittlung 2026

Stand: Juni 2025

Bodenklimaraum	Schicht cm	Sommerungen Aussaat/Pflanzung März		Sommerungen Aussaat/Pflanzung April	
		VF Blattfrucht* kg N _{min} /ha	VF Getreide kg N _{min} /ha	VF Blattfrucht* kg N _{min} /ha	VF Getreide kg N _{min} /ha
9; 46; 51 sandige Böden (Ost)	0-30	13	16	14	17
	30-60	9	10	8	10
	60-90	9	9	7	8
	Gesamt	31	35	29	35
48; 50 sandige Böden (West)	0-30	12	18	13	19
	30-60	9	10	9	13
	60-90	10	8	9	10
	Gesamt	31	36	31	42
45, 47 Lehmböden, leichte Lehmböden	0-30	13	20	17	22
	30-60	13	18	16	18
	60-90	13	15	14	15
	Gesamt	39	54	47	55
11, 34 schwere Lehmböden, Hügelland (>200m)	0-30	-	17	-	16
	30-60	-	16	-	16
	60-90	-	15	-	14
	Gesamt	-	48	-	46
52 Marschen, Tonböden	0-30	15	16	18	19
	30-60	15	16	16	18
	60-90	15	14	14	14
	Gesamt	45	46	48	51
*Blattvorfrucht: u.a. Ackergras, Mais, Zuckerrübe, Kartoffel, Leguminosen, Gemüse und Brache					